

# Komplex analys II, v.44

# Komplexa serier. Allmänna satser

Betrakta en följd  $c_1, c_2, c_3, \dots$ , betecknad  $\{c_j\}_{j=1}^{\infty}$ , av komplexa tal. Den  $n$ :te partialsumman  $S_n$  definieras genom

$$S_n = \sum_{j=1}^n c_j = c_1 + c_2 + \cdots + c_n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (5.1)$$

Om följen  $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$  har ett gränsvärde  $S$  ( $\neq \infty$ ) säger vi att den oändliga serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  är konvergent med summan  $S$ . Detta betecknas

$$\sum_{j=1}^{\infty} c_j = S. \quad (5.2)$$

Om följen  $\{S_n\}$  inte har ett gränsvärde är serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  divergent.

# Komplexa serier. Allmänna satser

Termerna i partialsumman  $S_n$  kan skrivas  $c_j = a_j + i b_j$ ,  $j = 1, \dots, n$ , där  $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ . Då fås

$$S_n = \sum_{j=1}^n c_j = \sum_{j=1}^n a_j + i \sum_{j=1}^n b_j = \sigma_n + i \tau_n, \quad (5.3)$$

där  $\sigma_n$  och  $\tau_n$  är de  $n$ te partialsummorna av de reella serierna  $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$  respektive  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ . Beteckna  $S = \sigma + i \tau$ . Med stöd av Sats 2.2 gäller:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S = \sigma + i \tau \Leftrightarrow \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma \text{ och } \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n = \tau \right).$$

Med andra ord har vi:

# Komplexa serier. Allmänna satser

Sats 5.1. Serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  konvergerar om och endast om de reella serierna  $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$  och  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$  båda konvergerar. Härvid gäller:

$$S = \sum_{j=1}^{\infty} c_j = \sum_{j=1}^{\infty} a_j + i \sum_{j=1}^{\infty} b_j = \sigma + i \tau. \quad (5.4)$$

Anmärkning: Studiet av konvergensen för en komplex serie kan således överföras på studiet av konvergensen för två reella serier.

# Komplexa serier. Allmänna satser

**Sats 5.2.** Om serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  konvergerar, så är  $\lim_{j \rightarrow \infty} c_j = 0$ .

**Bevis:** Sätt  $c_j = a_j + i b_j$ . Då har vi att  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  konvergerar medför att de reella serierna  $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$  och  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$  båda konvergerar, vilket i sin tur medför att  $a_j \rightarrow 0$  och  $b_j \rightarrow 0$  då  $j \rightarrow \infty$ , och därmed har vi att  $c_j \rightarrow 0$  då  $j \rightarrow \infty$ .

□

**Anmärkning:** Om serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  är konvergent så gäller med stöd av föregående sats att det för  $\varepsilon = 1$  existerar ett heltal  $N$  så att  $|c_j| < 1$  såsnart  $j > N$ . Därmed kan vi hitta en konstant  $K > 0$  så att  $|c_j| \leq K$  för alla  $j$ .

# Komplexa serier. Allmänna satser

Exempel 5.1. Visa att serien  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1+i)^{2k}}{2^k}$  är divergent.

Lösning: Vi har att

$$\frac{1}{2^k} (1+i)^{2k} = \left( \frac{(1+i)^2}{2} \right)^k = \left( \frac{2i}{2} \right)^k = i^k \not\rightarrow 0, \text{ då } k \rightarrow \infty.$$

# Komplexa serier. Allmänna satser

**Definition 5.1.** Den komplexa serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  är absolut konvergent om  
serien  $\sum_{j=1}^{\infty} |c_j|$  är konvergent.

För positiva reella serier med termerna uppfyllande  $0 \leq x_j \leq y_j$ ,  $j = 1, 2, \dots$ , gäller:  $\sum_{j=1}^{\infty} y_j$  konvergent  $\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} x_j$  konvergent. (Majorantprincipen).

# Komplexa serier. Allmänna satser

Sats 5.3. Serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ , där  $c_j = a_j + i b_j$ , är absolut konvergent om och endast om både  $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$  och  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$  är absolut konvergenta reella serier.

Bevis: 1. Antag att  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  är absolut konvergent. Eftersom  $|a_j| \leq |c_j|$  och  $|b_j| \leq |c_j|$  för alla  $j$ , så är även serierna  $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$  och  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$  absolut konvergenta.

2. Antag att  $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$  och  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$  är absolut konvergenta. Då  $|c_j| \leq |a_j| + |b_j|$  för alla  $j$ , och serien  $\sum_{j=1}^{\infty} (|a_j| + |b_j|)$  är konvergent, så är även serien  $\sum_{j=1}^{\infty} |c_j|$  konvergent. Alltså är serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  absolut konvergent.  $\square$

# Komplexa serier. Allmänna satser

Exempel 5.2. En serie som är konvergent behöver inte vara absolut konvergent. Serien

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j \frac{(1+i)}{j} = (1+i) \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j}$$

# Komplexa serier. Allmänna satser

är konvergent, ty den reella serien  $-1 + 1/2 - 1/3 + 1/4 - \dots$  har alternanterande termer vilkas belopp är strängt avtagande mot 0. Däremot är serien

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left| (-1)^j \frac{(1+i)}{j} \right| = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{j}$$

divergent.

# Komplexa serier. Allmänna satser

För en reell serie gäller att om den är absolut konvergent så är den även konvergent. Med stöd av detta fås:

**Sats 5.4.** Om en komplex serie  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ ,  $c_j = a_j + i b_j$ , är absolut konvergent så är den även konvergent. Vidare gäller:

$$\left| \sum_{j=1}^{\infty} c_j \right| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |c_j|. \quad (5.5)$$

Bevis: Av antagandet och Sats 5.3 följer att serierna  $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$  och  $\sum_{j=1}^{\infty} |b_j|$  är konvergenta. Då är även de reella serierna  $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$  och  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$  konvergenta. Med stöd av Sats 5.1 är då serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  konvergent. Beteckna  $S := \sum_{j=1}^{\infty} |c_j|$ . Den generaliserade triangelolikheten ger att för varje  $n$  gäller  $|\sum_{j=1}^n c_j| \leq \sum_{j=1}^n |c_j| \leq S$ . Om vi låter  $n \rightarrow \infty$  erhålls (5.5).  $\square$

# Komplexa serier. Allmänna satser

Exempel 5.3. Antag att  $|c| < 1$ , där  $c$  är ett komplex tal. Eftersom

$$(1 - c)(1 + c + c^2 + \dots + c^n) = 1 - c^{n+1},$$

erhåller vi

$$1 + c + \dots + c^n = \frac{1 - c^{n+1}}{1 - c}.$$

Då  $|c| < 1 \Rightarrow c^{n+1} \rightarrow 0$ , då  $n \rightarrow \infty$ , får vi att

$$\sum_{j=0}^{\infty} c^j = \frac{1}{1 - c}, \quad \text{då } |c| < 1. \tag{5.6}$$

Detta är den geometriska serien med rationen  $c$ . Om  $|c| \geq 1$  så divergerar serien, ty då gäller  $c^j \not\rightarrow 0$  då  $j \rightarrow \infty$ .

# Komplexa serier. Allmänna satser

Exempel 5.4. Undersök om serien  $\sum_{j=1}^{\infty} j \left(\frac{1+2i}{3}\right)^j$  är konvergent

Lösning: Kvotttestet för serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ : Serien är absolut konvergent om  $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{|c_{j+1}|}{|c_j|} = d$  och  $0 \leq d < 1$ . Serien är divergent om  $d > 1$  och konvergensen är obestämbart om  $d = 1$ .

(1)  $d < 1$ . Välj  $\varepsilon > 0$  och  $J$  så att  $\frac{|c_{j+1}|}{|c_j|} < d + \varepsilon < 1$  för  $j \geq J$ . Då är  $|c_{j+1}| < |c_j|(d+\varepsilon)$  för  $j \geq J$ . För  $k > J$  gäller  $|c_k| < |c_{k-1}|(d+\varepsilon) < |c_{k-2}|(d+\varepsilon)^2 < \dots < |c_J|(d+\varepsilon)^{k-J}$ . Då har vi att  $|d + \varepsilon| < 1 \Rightarrow \sum_{k=J+1}^{\infty} |c_k|(d+\varepsilon)^{k-J} = |c_J|(d+\varepsilon) \sum_{j=0}^{\infty} (d+\varepsilon)^j$  konvergent  $\Rightarrow \sum_{k=J+1}^{\infty} |c_k|$  konvergent  $\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} c_j$  absolut konvergent.

(2) Om  $d > 1$  så finns ett  $J$  så att  $|c_{j+1}|/|c_j| > 1$  för  $j \geq J$ , vilket medför att för  $k > J$  gäller  $|c_k| > |c_{k-1}| > \dots > |c_J|$ , vilket i sin tur medför att  $c_j \not\rightarrow 0$  då  $j \rightarrow \infty$ . Serien är divergent.

(3) För  $c_j = \frac{1}{j}$  och  $c_j = \frac{(-1)^j}{j}$  ger kvotttestet  $d = 1$ . Den första serien är divergent och den andra är konvergent.

# Komplexa serier. Allmänna satser

Vi undersöker  $|c_j| = \left| j \left( \frac{1+2i}{3} \right)^j \right| = j \left( \frac{\sqrt{5}}{3} \right)^j$ .

$$\frac{|c_{j+1}|}{|c_j|} = \frac{j+1}{j} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} \rightarrow \frac{\sqrt{5}}{3} < 1, \text{ då } j \rightarrow \infty,$$

och då är serien  $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$  absolut konvergent och därmed även konvergent enligt Sats 5.4.

# Likformig konvergens

Låt  $f_1(z), f_2(z), \dots = \{f_n(z)\}_{n=1}^{\infty}$  vara en följd av funktioner som är definierade på en mängd  $D \subseteq \mathbb{C}$ . Antag att följen konvergerar (punktvis) i  $D$  mot en funktion  $f(z)$ . Alltså för varje  $\varepsilon > 0$  och  $z \in D$  existerar ett heltal  $N (= N(z, \varepsilon))$  sådant att  $|f(z) - f_n(z)| < \varepsilon$  såsnart  $n \geq N$ . Här är gränsindexet  $N$  beroende av både  $\varepsilon$  och  $z$ . Vid likformig konvergens beror gränsindexet enbart av  $\varepsilon$ .

**Definition 5.2.** Följden  $\{f_n(z)\}_{n=1}^{\infty}$  konvergerar *likformigt* mot funktionen  $f(z)$  på mängden  $D$  om för varje  $\varepsilon > 0$  finns ett heltal  $N_{\varepsilon}$  sådant att

$$n \geq N_{\varepsilon} \Rightarrow |f(z) - f_n(z)| < \varepsilon \text{ för alla } z \in D. \quad (5.7)$$

# Likformig konvergens

Betrakta nu funktionsserien  $\sum_{j=1}^{\infty} f_j(z)$  och antag att den konvergerar mot  $S(z)$  för varje  $z \in D$ . Partialsummorna  $S_n(z)$  för funktionsserien ges av  $S_n(z) = \sum_{j=1}^n f_j(z)$ ,  $n = 1, 2, \dots$

Definition 5.3. Funktionsserien  $\sum_{j=1}^{\infty} f_j(z)$  konvergerar likformigt mot  $S(z)$  på  $D$ , om följen av partialsummor  $\{S_n(z)\}_{n=1}^{\infty}$  konvergerar likformigt mot  $S(z)$  på  $D$ .

# Likformig konvergens

Likformiga konvergensen för en funktionsserie kan säkerställas med hjälp av Weierstrass M-test:

**Sats 5.5.** Antag att  $\sum_{j=1}^{\infty} M_j$  är en konvergent serie med reella icke-negativa termer. Antag att för alla  $z \in D$  och alla index  $j > J$  gäller att  $|f_j(z)| \leq M_j$ . Då är funktionsserien  $\sum_{j=1}^{\infty} f_j(z)$  likformigt konvergent på  $D$ .

Bevis: Tag godtyckligt  $\varepsilon > 0$ . Beteckna  $s_n = \sum_{j=1}^n M_j$  och  $S_n(z) = \sum_{j=1}^n f_j(z)$ . Eftersom följen  $\{s_n\}$  är konvergent är den en Cauchy-följd. Vi kan välja  $N_\varepsilon > J$  så att för  $m > n > N_\varepsilon$  gäller

$$|s_m - s_n| = \left| \sum_{j=n+1}^m M_j \right| = \sum_{j=n+1}^m M_j < \varepsilon. \quad (5.8)$$

# Likformig konvergens

Men då är även  $\{S_n(z)\}$  en Cauchy-följd för varje  $z \in D$ , ty för  $m > n > N_\epsilon > J$  gäller med stöd av (5.8) att

$$|S_m(z) - S_n(z)| = \left| \sum_{j=n+1}^m f_j(z) \right| \leq \sum_{j=n+1}^m |f_j(z)| \leq \sum_{j=n+1}^m M_j < \epsilon. \quad (5.9)$$

Därmed är  $\sum_{j=1}^{\infty} f_j(z)$  konvergent för varje  $z \in D$ , och serien konvergerar i  $D$  mot en funktion  $S(z)$ . Om vi låter  $m \rightarrow \infty$  i (5.9) ( $S_m(z) \rightarrow S(z)$ ) erhålls:

$$|S(z) - S_n(z)| \leq \epsilon \text{ för alla } z \in D \text{ då } n > N_\epsilon.$$

Alltså konvergerar  $\sum_{j=1}^{\infty} f_j(z)$  likformigt mot  $S(z)$  på  $D$ . □

# Likformig konvergens

**Sats 5.6.** *Låt  $\{f_n(z)\}$  vara en följd av kontinuerliga funktioner definierade i mängden  $D$ , och antag att följen konvergerar likformigt mot  $f(z)$  på  $D$ . Då är  $f(z)$  kontinuerlig på  $D$ .*

# Likformig konvergens

Bevis: Tag  $\varepsilon > 0$  och välj en godtycklig punkt  $z_0 \in D$ . På grund av att följden  $\{f_n(z)\}$  är likformigt konvergent kan vi välja  $N$  så stort att  $|f(z) - f_N(z)| < \varepsilon/3$  för alla  $z \in D$ . Eftersom  $f_N$  är kontinuerlig i  $z_0$  finns det ett  $\delta > 0$  sådant att  $(z \in D \wedge |z_0 - z| < \delta) \Rightarrow |f_N(z_0) - f_N(z)| < \varepsilon/3$ . Men då gäller för  $|z_0 - z| < \delta$  att

$$\begin{aligned}|f(z_0) - f(z)| &= |f(z_0) - f_N(z_0) + f_N(z_0) - f_N(z) + f_N(z) - f(z)| \\&\leq |f(z_0) - f_N(z_0)| + |f_N(z_0) - f_N(z)| + |f_N(z) - f(z)| \\&< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.\end{aligned}$$

Därmed är  $f(z)$  kontinuerlig i varje punkt  $z_0 \in D$ .  $\square$

# Likformig konvergens

Anmärkning: Om den i mängden  $D$  likformigt konvergenta funktionsserien  $S(z) = \sum_{j=1}^{\infty} f_j(z)$  har kontinuerliga termer  $f_j(z)$  i  $D$ , så är även partialsummorna  $S_n(z) = \sum_{j=1}^n f_j(z)$  kontinuerliga i  $D$ . Med stöd av Sats 5.6 är då  $S(z)$  kontinuerlig i  $D$ .

# Potensserier

**Definition 5.4.** En funktionsserie av formen  $\sum_{j=0}^{\infty} c_j (z - z_0)^j$ , där  $c_j$  och  $z_0$  är komplexa konstanter, kallas en potensserie. Konstanterna  $c_j$  är koefficienterna för potensserien.

Vi skall i resten av detta kapitel besvara frågorna: För vilka  $z$  konvergerar potensserien? När konvergerar den likformigt? Är gränsfunktionen kontinuerlig? Är gränsfunktionen analytisk?

# Potensserier

**Sats 5.7.** Om en potensserie konvergerar för  $z = z_1 (\neq z_0)$ , så konvergerar den absolut för varje  $z$  med  $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ .

**Bevis:** Eftersom serien  $\sum_{j=0}^{\infty} c_j (z_1 - z_0)^j$  konvergerar är seriens termer begränsade, (anmärkningen efter Sats 5.2), och det finns en positiv konstant  $M$  sådan att  $|c_j (z_1 - z_0)^j| \leq M$  för alla  $j$ . Med beaktande av att  $|c_j| \leq M/|z_1 - z_0|^j$  får vi:

$$|c_j (z - z_0)^j| = |c_j| |z - z_0|^j \leq M \left( \frac{|z - z_0|}{|z_1 - z_0|} \right)^j. \quad (5.10)$$

# Potensserier

Enligt antagandet är  $\frac{|z-z_0|}{|z_1-z_0|} < 1$ . Därmed konvergerar den geometriska serien  $\sum_{j=0}^{\infty} M \left( \frac{|z-z_0|}{|z_1-z_0|} \right)^j$ . Majorantprincipen och (5.10) ger då att potensserien  $\sum_{j=0}^{\infty} c_j (z - z_0)^j$  är absolut konvergent för varje  $z$  med  $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ .

□

# Potensserier

**Definition 5.5.** Låt  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  vara en reell talföljd. Då definieras limes superior och limes inferior genom:

$$\limsup a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sup \{a_n, a_{n+1}, \dots\} \right), \quad (5.11)$$

$$\liminf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf \{a_n, a_{n+1}, \dots\} \right). \quad (5.12)$$

Vi gör nu en uppräkning av egenskaperna för  $\limsup$  och  $\liminf$ . För bevisen hänyvisas till en kurs i reell analys.

# Potensserier

För en obegränsad reell talföljd  $\{a_n\}$  gäller:

$\limsup a_n = +\infty \Leftrightarrow \{a_n\}$  är obegränsad uppåt,

$\limsup a_n = -\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty,$

$\liminf a_n = -\infty \Leftrightarrow \{a_n\}$  är obegränsad nedåt,

$\liminf a_n = +\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty.$

# Potensserier

Då  $\limsup a_n$  och  $\liminf a_n$  är ändliga karakteriseras de av följande sats.

Sats 5.8. (1)  $\limsup a_n = a \in \mathbb{R}$  om och endast om

- a)  $\forall \varepsilon > 0 \exists N : n > N \Rightarrow a_n < a + \varepsilon,$
- b) För varje  $\varepsilon > 0$  och varje heltalet  $N$  finns ett  $n > N$ , så att  $a_n > a - \varepsilon$ .

(2)  $\liminf a_n = a \in \mathbb{R}$  om och endast om

- a)  $\forall \varepsilon > 0 \exists N : n > N \Rightarrow a_n > a - \varepsilon,$
- b) För varje  $\varepsilon > 0$  och varje heltalet  $N$  finns ett  $n > N$ , så att  $a_n < a + \varepsilon$ .

Anmärkning: Sats 5.8 medför då att  $a = \limsup a_n \Leftrightarrow$  för varje  $\epsilon > 0$  finns ett ändligt antal  $a_n > a + \varepsilon$  och ett oändligt antal  $a_n > a - \varepsilon$ .

$a = \liminf a_n \Leftrightarrow$  för varje  $\epsilon > 0$  finns ett ändligt antal  $a_n < a - \varepsilon$  och ett oändligt antal  $a_n < a + \varepsilon$ .

# Potensserier

**Definition 5.6.** Talet  $\alpha$  är en *hopningspunkt* för den reella talföljden  $\{a_n\}$ , om för varje  $\varepsilon > 0$  och varje positivt heltal  $N$  alltid finns något index  $n \geq N$  med  $|x_n - \alpha| < \varepsilon$ .

Varje  $\varepsilon$ -omgivning av en hopningspunkt innehåller oändligt många tal ur följd. Man kan visa att det bland alla hopningspunkter för en given talföld  $\{a_n\}$  alltid finns en största och en minsta hopningspunkt. ( $+\infty$  största om  $\{a_n\}$  obegränsad uppåt och  $-\infty$  minsta om  $\{a_n\}$  obegränsad nedåt). Om talföljden  $\{a_n\}$  är konvergent har den endast en hopningspunkt. Nu kan  $\limsup a_n$  och  $\liminf a_n$  kopplas till hopningspunkterna för  $\{a_n\}$ .

# Potensserier

**Sats 5.9.**  $\limsup a_n$  är den största hopningspunkten för följen  $\{a_n\}$  och  $\liminf a_n$  är den minsta hopningspunkten för följen. Om  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  existerar gäller  $\limsup a_n = \liminf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ .

**Anmärkning:** Av Sats 5.9 följer att  $\liminf a_n \leq \limsup a_n$ .

**Exempel 5.5.** Bestäm  $\limsup a_n$  och  $\liminf a_n$  för  $a_n = \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^n$ ,  $n = 1, 2, \dots$

**Lösning:** Vi har att

$$b_n = a_{2n} = \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} \rightarrow e, \text{ då } n \rightarrow \infty,$$

$$c_n = a_{2n+1} = \left(1 + \frac{-1}{2n+1}\right)^{2n+1} \rightarrow e^{-1} = \frac{1}{e}, \text{ då } n \rightarrow \infty.$$

Därmed har vi att  $\limsup a_n = e$  och  $\liminf a_n = \frac{1}{e}$ .

# Potensserier

Vi bevisar nu en användbar sats för bestämning av  $\limsup$ .

**Sats 5.10.** *Antag att  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha > 0$  och  $\limsup b_n = \beta$ . Då gäller*

$$\limsup(a_n b_n) = \alpha \cdot \beta. \quad (5.13)$$

**Bevis:** Eftersom  $\limsup b_n = \beta$  kan vi hitta en delföljd  $\{b_{n_k}\}$  av  $\{b_n\}$ , sådan att  $b_{n_k} \rightarrow \beta$ , då  $k \rightarrow \infty$ . För delföljden  $\{a_{n_k} b_{n_k}\}$  av  $\{a_n b_n\}$  gäller att  $a_{n_k} b_{n_k} \rightarrow \alpha \beta$ , då  $k \rightarrow \infty$ . För en godtycklig delföljd  $\{a_{n_l} b_{n_l}\}$  av  $\{a_n b_n\}$  sådan att  $a_{n_l} b_{n_l} \rightarrow \gamma$ , då  $l \rightarrow \infty$  gäller:  $b_{n_l} \rightarrow \frac{\gamma}{\alpha}$ , då  $l \rightarrow \infty$ .  $\limsup b_n = \beta \Rightarrow \frac{\gamma}{\alpha} \leq \beta \Rightarrow \gamma \leq \alpha \beta$ . Alltså ges den största hopningspunkten för  $\{a_n b_n\}$  av  $\alpha \beta$ . Därmed är  $\limsup(a_n b_n) = \alpha \beta$ .  $\square$

**Anmärkning:** En helt analog sats gäller för  $\liminf(a_n b_n)$ .

# Potensserier

Sats 5.11. Vi betraktar potensserien

$$\sum_{j=0}^{\infty} c_j (z - z_0)^j, \quad (5.14)$$

och definierar ett tal  $R$ ,  $0 \leq R \leq +\infty$ , kallat konvergensradien för potensserien, genom formeln

$$R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|c_n|}}. \quad (5.15)$$

Då gäller:

- (1) Potensserien är absolut konvergent för  $|z - z_0| < R$ .
- (2) Potensserien konvergerar likformigt i varje cirkelskiva av formen  $|z - z_0| \leq R' < R$   
 ~~$z_0 \leq R' < R$~~
- (3) Potensserien divergerar för  $|z - z_0| > R$ .

# Potensserier

bevis: Vi behandlar först fallen (1) och (2). Om  $R = 0$  har vi inget att bevisa. Antag att  $R > 0$ . Välj  $K$  så att

$$\frac{1}{R} < K < \frac{1}{R'}.$$

Då gäller  $R > 1/K \Rightarrow K > \limsup \sqrt[n]{|c_n|}$ . Alltså finns det ett ändligt antal  $c_j$  med  $\sqrt[j]{|c_j|} \geq K$ . (Se anmärkningen efter Sats 5.8). För  $j > J$  gäller det att  $\sqrt[j]{|c_j|} < K$ . För alla  $z$  i cirkelskivan  $|z - z_0| \leq R'$  gäller därmed för  $j > J$  att

$$|c_j(z - z_0)^j| = (\sqrt[j]{|c_j|} |z - z_0|)^j < (K R')^j. \quad (5.16)$$

Eftersom  $K R' < 1$  konvergerar  $\sum_{j=J+1}^{\infty} (K R')^j$  och därmed konvergerar potensserien (5.14) absolut i  $|z - z_0| \leq R'$ . Då konvergerar potensserien även absolut i  $|z - z_0| < R$ , och fallet (1) är bevisat. Om vi sätter  $M_j = 1$  för  $j = 0, 1, \dots, J$  och  $M_j = (K R')^j$  för  $j = J + 1, J + 2, \dots$ , så konvergerar  $\sum_{j=0}^{\infty} M_j$  och  $|c_j(z - z_0)^j| \leq M_j$  för alla  $j > J$  och alla  $z$  i cirkelskivan  $|z - z_0| \leq R'$ . Med stöd av Weierstrass M-test, Sats 5.5, konvergerar då potensserien likformigt i cirkelskivan  $|z - z_0| \leq R'$ . Därmed är påståendet (2) bevisat.

# Potensserier

För att bevisa påståendet (3) väljer vi  $z$  så att  $|z - z_0| > R$  och  $K$  sådant att

$$\frac{1}{|z - z_0|} < K < \frac{1}{R}. \quad (\frac{1}{R} = +\infty \text{ om } R = 0)$$

# Potensserier

Då gäller  $R < 1/K \Rightarrow K < \limsup \sqrt[n]{|c_n|}$ . Alltså finns det oändligt många koefficienter  $c_j$  sådana att  $\sqrt[j]{|c_j|} > K$ . För sådana  $c_j$  gäller

$$|c_j(z - z_0)^j| = (\sqrt[j]{|c_j|} |z - z_0|)^j > (K|z - z_0|)^j > 1.$$

Men då gäller inte att  $c_j(z - z_0)^j \rightarrow 0$  då  $j \rightarrow \infty$ , och potensserien är därmed divergent.  $\square$

# Potensserier

**Anmärkning 1:** För en potensserie gäller då ett av tre alternativ: 1) Serien konvergerar enbart för  $z = z_0$  ( $R = 0$ ), 2) serien konvergerar för alla  $z \in \mathbb{C}$  ( $R = +\infty$ ) eller 3) serien konvergerar i en öppen cirkelskiva  $|z - z_0| < R$  och eventuellt i punkter på cirkeln  $|z - z_0| = R$ .

**Anmärkning 2:** Den funktion  $S(z)$  som potensserien konvergerar mot i  $|z - z_0| < R$  är kontinuerlig, ty givet godtyckligt  $z$  i  $|z - z_0| < R$  finns det ett  $R' < R$  så att  $z$  ligger i  $|z - z_0| \leq R'$ . I denna slutna cirkelskiva är potensserien likformigt konvergent och partialsummorna är kontinuerliga funktioner. Med stöd av Sats 5.13 är då  $S(z)$  kontinuerlig i punkten  $z$  och därmed i hela  $|z - z_0| < R$ .

# Potensserier

**Exempel 5.6.** Utveckla funktionen  $S(z) = \frac{z}{z^2 - 4}$  i potensserie kring punkten  $z_0 = 0$ .

Lösning: Vi har att

$$\begin{aligned}\frac{z}{z^2 - 4} &= \frac{z}{(z - 2)(z + 2)} = \frac{1/2}{z - 2} + \frac{1/2}{z + 2} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - (-\frac{z}{2})} \\ &= -\frac{1}{4} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^j + \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{2}\right)^j \\ &= \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\left(-\frac{1}{2}\right)^j - \left(\frac{1}{2}\right)^j\right) \cdot z^j = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{\infty} c_j z^j.\end{aligned}$$

Då har vi att  $c_{2j} = 0 \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[2j]{|c_{2j}|} = 0$ . Vidare är  $c_{2j+1} = -2\left(\frac{1}{2}\right)^{2j+1}$  så vi får

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[2j+1]{|c_{2j+1}|} = \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[2j+1]{2\left(\frac{1}{2}\right)^{2j+1}} = \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[2j+1]{2} \cdot \frac{1}{2} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Därmed har vi att  $\limsup_n \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{1}{2}$  vilket betyder att konvergensradien är  $R = 2$ . Alltså erhåller vi utvecklingen

$$\frac{z}{z^2 - 4} = -\frac{z}{4} - \frac{z^3}{16} - \frac{z^5}{64} - \frac{z^7}{256} - \dots \quad \text{för } |z| < 2.$$

# Derivator av potensserier

Om vi i potensserien (5.14) substituerar  $z_1 = z - z_0$  så erhåller vi en potensserie av formen  $\sum_{j=0}^{\infty} c_j z_1^j$ . Vi kan utan att förlora i allmängiltighet inskränka behandlingen till potensserier av formen

$$S(z) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j z^j. \quad (5.17)$$

Antag att potensserien (5.17) har konvergensradien  $R > 0$ .

# Derivator av potensserier

Sats 5.12. Den termvis deriverade potensserien

$$S_1(z) = \sum_{j=1}^{\infty} j c_j z^{j-1} \quad (5.18)$$

har samma konvergensradie  $R_1 = R$  som serien (5.17).

Bevis: Eftersom  $\lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[j]{j} = 1 > 0$  erhålls med stöd av Sats 5.10 att

$$\begin{aligned} \limsup \sqrt[n]{|n c_n|} &= \limsup (\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{|c_n|}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \limsup \sqrt[n]{|c_n|} = 1 \cdot \frac{1}{R} \\ &= \frac{1}{R}. \end{aligned}$$

Konvergensradien  $R_1$  för serien (5.18) är då  $R_1 = 1/(1/R) = R$ . □

# Derivator av potensserier

Anmärkning: Genom upprepad användning av Sats 5.24 får vi att serierna

$$\sum_{j=2}^{\infty} j(j-1)z^{j-2}, \sum_{j=3}^{\infty} j(j-1)(j-2)z^{j-3}, \dots$$

alla har samma konvergensradie  $R$  som serien (5.17).

Sats 5.13. Låt  $S(z)$  och  $S_1(z)$  vara givna av (5.17) respektive (5.18). Då gäller för  $|z| < R$  att  $S'(z) = S_1(z)$ . (Den termvis deriverade seriens summa = derivatan av den givna seriens summa).

# Derivator av potensserier

$$\text{*) } |z+h| \leq |z| + |h| < |z| + \frac{R - |z|}{2} = \frac{R+|z|}{2} < R$$

Bevis: Välj godtyckligt  $z$  sådant att  $|z| < R$ . Välj  $\delta = (R - |z|)/2$  och antag att  $|h| < \delta$ . Då gäller  $|z+h| < R$  och

$$S(z+h) - S(z) = \sum_{j=1}^{\infty} c_j ((z+h)^j - z^j) = c_1 h + \sum_{j=2}^{\infty} c_j ((z+h)^j - z^j).$$

Vidare erhålls

$$\frac{S(z+h) - S(z)}{h} - S_1(z) = \sum_{j=2}^{\infty} c_j \left( \frac{(z+h)^j - z^j}{h} - j z^{j-1} \right). \quad (5.19)$$

$$(S_1(z) = \sum_{j=1}^{\infty} j c_j z^{j-1})$$

# Derivator av potensserier

Med stöd av binomialteoremet gäller

$$\begin{aligned}\frac{(z+h)^j - z^j}{h} - jz^{j-1} &= \frac{z^j + \binom{j}{1}z^{j-1}h^1 + \dots + \binom{j}{j}h^j - z^j}{h} - jz^{j-1} \\ &= \sum_{k=2}^j \binom{j}{k} z^{j-k} h^{k-1}.\end{aligned}$$

# Derivator av potensserier

Då uppskattar vi belloppet

$$\begin{aligned} \left| \frac{(z+h)^j - z^j}{h} - jz^{j-1} \right| &\leq \sum_{k=2}^j \binom{j}{k} |z|^{j-k} |h|^{k-1} \\ &\leq |h| \sum_{k=2}^j \binom{j}{k} (R-2\delta)^{j-k} \delta^{k-2} \\ &= \frac{|h|}{\delta^2} \sum_{k=2}^j \binom{j}{k} (R-2\delta)^{j-k} \delta^k \\ &< \frac{|h|}{\delta^2} \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} (R-2\delta)^{j-k} \delta^k = \frac{|h|}{\delta^2} ((R-2\delta) + \delta)^j \\ &= \frac{|h|}{\delta^2} (R-\delta)^j. \end{aligned}$$

# Derivator av potensserier

Med stöd av (5.19) får vi då att

$$\left| \frac{S(z+h) - S(z)}{h} - S_1(z) \right| \leq \frac{|h|}{\delta^2} \underbrace{\sum_{j=2}^{\infty} |c_j|(R-\delta)^j}_{\text{Konvergent } \times \times}. \quad (5.20)$$

$$\times \times \quad R - \delta = R - \frac{R - |z|}{2} = \frac{R + |z|}{2} < R$$

Högra ledet i (5.20) går mot noll dä  $h \rightarrow 0$ .

Alltså är  $S'(z) = S_1(z)$ .  $\square$

# Derivator av potensserier

Anmärkning: Genom upprepad användning av Sats 5.24 och Sats 5.13 erhåller vi följande teorem som en sammanfattning av undersökningarna i detta avsnitt.

Sats 5.14. Låt  $S(z) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j (z - z_0)^j$  med konvergensradien  $R > 0$ . Då är  $S(z)$  analytisk i  $|z - z_0| < R$ . Vidare har  $S(z)$  derivator av alla ordningar i  $|z - z_0| < R$ , som erhålls genom termvis derivering av serien. Alltså:

$$S^{(k)}(z) = \sum_{j=k}^{\infty} j(j-1) \cdot \dots \cdot (j-k+1) c_j (z - z_0)^{j-k}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (5.21)$$

Vi avslutar detta kapitel med tre viktiga potensserier.

# Derivator av potensserier

**Exempel 5.7.** Betrakta potensserien  $S(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{j!}$ . Serien har konvergensradien  $R = +\infty$  (övningsuppgift). Alltså är  $S(z)$  med stöd av Sats 5.14 analytisk i hela  $\mathbb{C}$  (en hel funktion), och  $S'(z)$  ges av

$$S'(z) = \sum_{j=1}^{\infty} j \frac{z^{j-1}}{j!} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{z^{j-1}}{(j-1)!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{j!} = S(z),$$

för alla  $z \in \mathbb{C}$ . Nu gäller för alla  $z \in \mathbb{C}$  att

$$(e^{-z} S(z))' = -e^{-z} S(z) + e^{-z} S'(z) = 0,$$

ty  $S(z) = S'(z)$ . Eftersom  $e^{-z} S(z)$  är analytisk i hela  $\mathbb{C}$  gäller  $e^{-z} S(z) = k$  för någon konstant  $k$  och alla  $z \in \mathbb{C}$ . Men då  $1 = e^{-0} S(0) = k$ , fås att  $S(z) = e^z$  i  $\mathbb{C}$ , och vi har att

$$e^z = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{j!} \quad \text{för alla } z \in \mathbb{C}. \tag{5.22}$$

# Derivator av potensserier

Exempel 5.8. För  $\sin z$  och  $\cos z$  erhålls då potensserierna

$$\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) = \frac{1}{2} \left( \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(iz)^j}{j!} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-iz)^j}{j!} \right) = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{z^{2j}}{(2j)!}, \quad (5.23)$$

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) = \frac{1}{2i} \left( \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(iz)^j}{j!} - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-iz)^j}{j!} \right) = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{z^{2j+1}}{(2j+1)!}, \quad (5.24)$$

där serierna (5.23) och (5.24) konvergerar absolut i hela  $\mathbb{C}$ .